

ロギノ

局所適用

男性用発毛治療

ZIMMAR

(成分)

ミノキシジル USP 5.0% w/v
ベース q.s

(化学名)

2, 4-Pyrimidinediamine, 6-(1-piperidinyl)-3, -oxide

(効果・効能)

男性用毛髪再生治療薬。

(使用方法)

- ・1日2回1mlを直接脱毛範囲に塗布する。
- ・1回の回数を守ることが大切で過剰に使用しても効果はない。
- ・効果を維持するには、継続して使用することが必要である。使用を中止すると、再び脱毛が始まる。

(警告及び使用上の注意)

外用のみ。服用しないこと。男性専用。

可燃性：火や炎から遠ざけること。

- ・女性に使用しない。
- ・ミノキシジル外用液5%は、頭頂部だけに効果があり、前頭部や生え際の後退のためのものではない。
- ・突発性及び、又は斑状の脱毛の場合は、使用しない。
- ・脱毛の原因を知ることなく、使用しない。
- ・18歳以下は使用しない。
- ・乳児や小児に使用しない。
- ・頭皮が赤い、炎症が起きている、感染している、ヒリヒリする、痛みを伴う場合は、使用しない。
- ・心疾患があるかどうか、使用前に医師に尋ねること。
- ・妊婦や授乳婦への使用は、有害である場合がある。
- ・体の他の部分には塗布しないこと。
- ・目に入らないよう、注意すること。万が一目に入った場合は、すぐに水で洗うこと。
- ・一部の使用者に、毛色及び、又は感触の変化があった。
- ・毛髪の再成長は、時間を要し、効果が現れるには、1日2回の使用で2ヶ月を要することがある。一部の男性においては、効果が現れるまでに、少なくとも4ヶ月を要することがある。
- ・発毛量は、個人それぞれ異なる為、本剤が、すべての男性に効果があるというわけではない。

(副作用)

胸痛、動悸、失神、眩暈、急激な体重増加、手足のむくみ、頭皮の炎症や赤み、顔のムダ毛等の副作用が見られることがある。4ヶ月使用しても改善が見られない場合は、治療を中止すること。

(包装) 60ml

(保管方法) 直射日光を避け30℃以下の湿気のない涼しい場所に保管すること。小児の手の届かない場所に保管すること。

(最終更新) 2016年3月


スポイトの使用法：

1. キャップと栓をボトルから外す。
2. スポイトの球状の部分を絞り、ボトルにスポイトを挿入する。球状の部分を離し、スポイトに1ml入るようにする。1ml以上溶液が入ってしまった場合は、余分な量を絞り、ボトルに戻す。
3. 治療したい頭皮の上にスポイトの先端を置き、優しく徐々に溶液を出すこと。溶液が頭皮から溢れるのを防ぐため、毎回少量塗布する。
4. 使用後は、ボトルの栓とキャップをしっかり閉めること。



スプレーポンプの使用法：

1. キャップと栓をボトルから外す。
2. ボトルに、スプレーポンプがしっかりとフィットするよう挿入すること。
3. 治療したい頭皮の上にスプレーポンプを置き、脱毛部分にめがけてポンプを一度押し、指先で溶液を広げる。1mlまでの溶液を、5回に分けて繰り返し塗布する。溶液が頭皮から溢れるのを防ぐため、毎回少量塗布すること。
4. 使用後は、ボトルの栓とキャップをしっかり閉めること。



ミノキシジル外用液5%は、男性の頭皮が一般の男性より薄毛の男性のためのものであり、(以下の図に示すように、頭頂部のみ)前頭部や禿げ上がってきた生え際のためのものではない。男性用ミノキシジル外用液5%は、薄毛や脱毛の状態の男性が再び発毛することが明らかになっている。



ミノキシジル外用液5%は、上の図で示した場所以外での脱毛の男性には、効果がない場合がある。

ZIMMAR

ZIMMAR PHARMA LIMITED
10 Margaret Street, London,
W1W8RL, United Kingdom